



TIOSTAR 800 SC

Koncentrát vo forme vodnej suspenzie s obsahom aktívnej síry (56,9%).

Rozsah a spôsob použitia:

Tiostar 800 SC je koloidným koncentrátom s obsahom 800 g/l síry určený na listovú aplikáciu do širokého spektra poľných, záhradných, ovocných a okrasných rastlín so zvýšenými nárokmi na výživu sírou.

Má veľmi dobrý vplyv na kvalitatívne parametre úrody (obsah bielkovín , mastných kyselín) a rovnomernosť úrody, v zahraničí je registrovaný aj ako fungicíd - preventívna ochrana proti múčnatkám.

Dávkovanie, termín aplikácie :

Plodina	Dávka v l/ha	Odporúčané množstvo vody v l/ha	Termín aplikácie	Vývojová fáza rastliny (BBCH)
Repka olejná	5	300-500	Na jeseň po vzídení rastlín	10-29
	8	300-500	Včasná jarná aplikácia	30-50
	6	300-500	Pred kvetom	50-57
Jačmeň, pšenica, raž	5	300-500	Po vzídení do začiatku odnožovania	10-19
Krmny jačmeň, triticale	5	300-500	Koniec odnožovania až začiatok stĺpkovania	23-30
Ovos	5	300-500	Do konca fázy klasenia	32-59
Kukurica na zrno a siláž	10	700-1000	Pri rozvinutí 2-6 listov	19-24
Zemiaky	5	300-500	Aplikácia na listovú plochu do konca kvitnutia	21-70
Cukrová repa	5	300-500	v čase rozvoja listov	20-26
	5	300-500	3-4 týždne po založení buliev	31-33
Peluška, hrach	5	300-500	V čase vývinutého 1.-4. pravého listu	11-19
Slečnica	5	300-500	Do fázy začiatku kvitnutia	30-59
Trávne porasty	20	3000-4000	Pred začatím vegetácie	-
	5	800-1000	Po navinutí chmelu	-
Chmel	5	1500-2000	V čase intenzívneho rastu	
	5	2500-3000	Po odkvitnutí	

Balenie : 10 l

Foliálna aplikácia je zdrojom rýchlo prijateľnej síry , ktorá spolu s dusíkom tvorí základnú časť aminokyselín a bielkovín), podieľa sa na efektívnom prijíme a využití dusíka rastlinou, čo vplýva na efektívnosť hnojenia.